

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与経路・時間	投与日数	1クール
IDA+Ara-C(3-7set)	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m ²	30分	d1-3	28日
	キロサイド	シタラビン	100 mg/m ²	24時間	d1-7	
DNR+Ara-C(5-7set)	ダウノマイシン	ダウノルビシン	50 mg/m ²	30分	d1-5	28日
	キロサイド	シタラビン	100 mg/m ²	24時間	d1-7	
HD-Ara-C	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m ² ×23時間		d1-5	28日
MIT+Ara-C	ノバントロン	ミトキサントロン	7 mg/m ²	30分	d1-3	28日
	キロサイド	シタラビン	200 mg/m ²	24時間	d1-5	
DNR+Ara-C	ダウノマイシン	ダウノルビシン	50 mg/m ²	30分	d1-3	28日
	キロサイド	シタラビン	200 mg/m ²	24時間	d1-5	
ACR+Ara-C	アクラシノン	アクリルビシン	20 mg/m ²	30分	d1-5	28日
	キロサイド	シタラビン	200 mg/m ²	24時間	d1-5	
A triple V	キロサイド	シタラビン	200 mg/m ²	24時間	d1-5	28日
	エトポシド	エトポシド	100 mg/m ²	3時間	d1-5	
	オンコピン	ピンクリスチン	0.8 mg/m ²	15分	d8	
	フィルデシン	ビンデシン	2 mg/m ²	15分	d10	
CAG(Ara-C持続)	アクラシノン	アクリルビシン	14 mg/m ²	30分	d1-4	28日
	キロサイド	シタラビン	20 mg/m ²	24時間	d1-14	
	G-CSF			皮下注	d1-14	
CAG(Ara-C皮下注)	アクラシノン	アクリルビシン	14 mg/m ²	30分	d1-4	28日
	キロサイド	シタラビン	10 mg/m ² ×2	皮下注	d1-14	
	G-CSF				皮下注	
MEC (低用量Ara-C)	ノバントロン	ミトキサントロン	8 mg/m ²	30分	d1-3	28日
	エトポシド	エトポシド	100 mg/m ²	3時間	d1-5	
	シタラビン	シタラビン	100 mg/m ²	24時間	d1-7	
MEC (中等量Ara-C)	ノバントロン	ミトキサントロン	8 mg/m ²	30分	d1-5	28日
	エトポシド	エトポシド	100 mg/m ²	2時間	d1-5	
	シタラビン	シタラビン	1000 mg/m ²	3時間	d1-5	
GO	マイロターグ	ゲムツズマブ オゾガマイシン	9 mg/m ²	2時間	d1	14日
FLAG-IDA	ノイトロジン	フィルグラスチム	300 μg/m ²	60分	d1-6	28日
	フルダラ	フルダラビン	30 mg/m ²	30分	d2-6	
	シタラビン	シタラビン	2000 mg/m ²	3時間	d2-6	
	イダマイシン	イダルビシン	10 mg/m ²	60分	d2-4	