

| レジメン名 | 一般名 | 投与量 | 投与経路・時間 | 投与日数 | 1クール |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|---------|-------|
| APL212寛解導入療法(A→D群) | イダルビシン | 12 mg/m ² | 30分 | d1-3 | |
| | シタラビン | 100 mg/m ² | 持続静注 24時間 | d1-7 | |
| APL212寛解導入療法(B群) | イダルビシン | 12 mg/m ² | 30分 | d1,2 | |
| | シタラビン | 100 mg/m ² | 持続静注 24時間 | d1-5 | |
| | トレチノイン | 45 mg/m ² | 内服 | d1- | |
| APL212寛解導入療法(B→D群) | イダルビシン | 12 mg/m ² | 30分 | d1 | |
| | シタラビン | 100 mg/m ² | 持続静注 24時間 | d1,2 | |
| | トレチノイン | 45 mg/m ² | 内服 | d1- | |
| APL212寛解導入療法(C群) | イダルビシン | 12 mg/m ² | 30分 | d1-3 | |
| | シタラビン | 100 mg/m ² | 持続静注 24時間 | d1-7 | |
| | トレチノイン | 45 mg/m ² | 内服 | d1- | |
| APL212寛解導入療法(C→D群) | イダルビシン | 12 mg/m ² | 30分 | d1 | |
| | トレチノイン | 45 mg/m ² | 内服 | d1- | |
| ATO(APL212地固め第1,3コース) | 三酸化ヒ素 | 0.15 mg/kg | 2時間 | 1週間に5日間 | 35日 |
| | メソトレキサート | 15mg/body | 髄注 | C2終了後 | |
| | シタラビン | 40 mg/body | 髄注 | C2終了後 | |
| | プレドニゾロン | 10 mg/body | 髄注 | C2終了後 | |
| DNR+Ara-C(3-5set)(APL212地固め第2コース) | ダウノルビシン | 50 mg/m ² | 30分 | d1-3 | 28日 |
| | シタラビン | 200 mg/m ² | 24時間 | d1-5 | |
| GO(APL212地固め第4コース) | ゲムツズマブオゾガマイシン | 4 mg/m ² | 2時間 | d1,15 | 28日 |
| APL212G寛解導入療法(A→D群) | イダルビシン | 12 mg/m ² | 30分 | d1-3 | |
| | トレチノイン | 45 mg/m ² | 内服 | d1- | |
| APL212G寛解導入療法(B群) | イダルビシン | 12 mg/m ² | 30分 | d1,2 | |
| | トレチノイン | 45 mg/m ² | 内服 | d1- | |
| APL212G寛解導入療法(C群) | イダルビシン | 8 mg/m ² | 30分 | d1-3 | |
| | トレチノイン | 45 mg/m ² | 内服 | d1- | |
| APL212G寛解導入療法(B,C→D群) | イダルビシン | 12 mg/m ² | 30分 | d1 | |
| | トレチノイン | 45 mg/m ² | 内服 | d1- | |
| ATO(APL212G地固め第1,2コース) | 三酸化ヒ素 | 0.15 mg/kg | 2時間 | 1週間に5日間 | 35日 |
| | メソトレキサート | 15mg/body | 髄注 | C2終了後 | |
| | シタラビン | 40 mg/body | 髄注 | C2終了後 | |
| | プレドニゾロン | 10 mg/body | 髄注 | C2終了後 | |
| APL205R 寛解導入 | 三酸化ヒ素 | 0.15 mg/kg | 2時間 | d1- | 最大60回 |
| | イダルビシン | 12 mg/m ² | 30分 | (d1,2) | |