

レジメン名	一般名	投与量	投与経路・時間	投与日数	1クール
BU+CY	シクロホスファミド	60 mg/kg	2hr	d1,2,3,4,	－
	ブスルファン	0.8 mg/kg×4	2hr	d5,6	
Flu+BU4	フルダラビン	30 mg/m2	30min	d1-6	－
	ブスルファン	0.8 mg/kg×4 2-4Gy	2hr	d5,6	
Flu+Mel 180	フルダラビン	25 mg/m2	30min	d1,2,3,4,5	－
	メルファラン	90 mg/m2	30min	d4,5	
ETP-CY-TBI(前処置)	エトポシド	15 mg/kg	6hr	d1,2	－
	シクロホスファミド	60 mg/kg	2hr	d3, 4 d-3,-2	
CY-TBI(前処置)	シクロホスファミド	60 mg/kg	2hr	d-1,2	－
G-combined Ara-C+CY	シタラビン	2 g/m2×2	2hr	d-5,d-4	－
	シクロホスファミド	60 mg/kg	2hr	d-3,d-2	
Flu+CY+ATG	フルダラビン	30 mg/m2	30min	d1,2,3,4	－
	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	3.75 mg/kg	6時間以上	d1,2,3,4	
	シクロホスファミド	300 mg/m2	1hr	d1,2,3,4	
Flu+Mel4+BU	フルダラビン	30 mg/m2	30分	d-7,-6,-5,-4,-3,7日	
	ブスルファン	0.8 mg/kg×4	2hr	d-7,-6,-5,-4	
	メルファラン	40 mg/m2	3分	d-3,-2	